

南門綜合醫院

內視鏡檢查與治療麻醉說明書

由於您的病情需要接受內視鏡檢查，麻醉可以免除檢查時的痛苦和恐懼與不適；但舒適、高品質的麻醉內視鏡檢查治療，也可能有以下之副作用及其併發症，在術前我們要先提醒您！

1. 對於已有的(或潛在的)心臟血管系統疾病之患者，麻醉後較易引起突發性急性心肌梗塞。
2. 對於已有的(或潛在的)心臟血管系統或腦血管疾病之患者，麻醉後較易發生腦中風。
3. 對於已有上呼吸道感染之患者，麻醉後痰液喀清不易，可能增加肺擴張不全或肺炎的機會。
4. 對於病情惡化中、休克、年老患者伴有心、肺、循環毛病或其他嚴重系統性疾病如狹心症、循環衰竭、肝、腎內分泌異常甚或意識不清的手術患者，麻醉的危險性增加，有時需術後轉至加護病房照護。
5. 對於特異體質之患者，麻醉後易發生惡性發燒(這是一種潛在遺傳疾病，現代醫學尚無適當之事前試驗)。
6. 由於藥物特界對過敏體質者，可能會引致不可預期之突發性之反應。
7. 急慢性傳染病或帶原者(如病毒肝炎、淋病、梅毒、後天免疫缺乏症候群等)，請事先告知我們，以便有效之加強麻醉中、後期之感染管制。
8. 麻醉後的恢復很快，平均 30 分鐘至 45 分鐘會恢復清醒，但有少數高低血壓、噁心及嘔吐、心律不整、顫抖麻醉後的症狀。有極少部份發生呼吸困難、發紺、意識不清、嚴重電解質異常，非短期內可恢復時，要轉到加護病房照護觀察。

***提醒您，極罕見的延遲性出血甚至可能在介入性治療（包括息肉切除等）10 天後發生。請儘快與本院護理站（電話：03-5261122，6 樓分機 621，7 樓分機 721，8 樓分機 821，生理功能檢查室聯絡分機 102）或逕赴本院急診就醫治療。**

*** 如果病患對上述說明仍有疑問，務請在簽名之前詢問醫師，或聽取其他醫師的意見作為參考。**