



南門綜合醫院

陰囊手術（睪丸固定、副睪丸、陰囊水腫切除） 說明書

請您詳細閱讀

這是一份有關您接受此項手術的效益、風險及替代方案的書面說明，我們希望您能充份瞭解資料的內容，如果經醫師說明後，您對此項手術仍有疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師將會為您詳細說明。

手術目的與步驟：

1. 睪丸固定術：治療隱睪症，使睪丸下降至陰囊內。
2. 副睪丸手術：切除精液囊腫及其它腫塊，或為了阻塞性無精蟲的患者，由副睪丸抽取精蟲。
3. 陰囊水腫切除：陰囊水腫囊袋藉由手術剝除，減輕不適感。

手術效益：（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

1. 睪丸固定術，可以避免睪丸功能的繼續受到傷害而喪失生殖能力，但由於隱睪症本身的睪丸先天發育上即有缺陷，手術後並不能使睪丸功能完全恢復正常。
2. 副睪丸手術，切除腫塊以判斷其病理診斷，並消除腫塊的不適感。也可以抽取精蟲以進行人工輔助生殖（試管嬰兒）。
3. 陰囊水腫切除，減輕水腫的不適感。

手術風險：（沒有任何手術是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。）

1. 傷口疼痛（<1%）。 2. 傷口感染（<1%）。 3. 傷口出血、血腫或瘀血（<1%）。
4. 陰囊腫脹（<1%）。 5. 睪丸缺血而壞死。 6. 副睪丸炎。
7. 其他（極少數發生手術本身以外之併發症）。

替代方案：（這個手術的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術，可能會有危險，請與醫師討論您的決定）

1. 睪丸固定術：無替代方案。但你可考慮先接受腦下垂體荷爾蒙治療後再接受手術治療。
2. 副睪丸手術及陰囊水腫切除術：可能藥物治療止痛（副睪丸炎）、其它取精方式（男性不孕）、以細針作水囊抽吸（陰囊水腫）等。

手術後之後續治療：

1. 陰囊的手術，一般不必拆線只要在門診追蹤換藥至 7~10 天。
2. 術後應避免劇烈活動。
3. 若有必須長期追蹤的狀況，請依醫師指示接受迴診（例如：睪丸固定術後的追蹤）。

是否有其他補充說明： 是 否

***如果病患對上述說明仍有疑問，務請在簽名之前詢問醫師，或聽取其他醫師的意見作為參考。**

中 華 民 國 年 月 日