

南門綜合醫院

腸阻塞手術說明書

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您詳細說明

手術（或醫療處置）：

一、手術的原因：


由於術後小腸沾粘、扭結或腫瘤造成腸道不通，可分為部分腸阻塞或完全腸阻塞，部份患者接受內科治療可治癒。但是亦可因小腸缺血，導致小腸壞死而需要手術治療。

二、腸阻塞原因：

1. 腸黏連、疝氣、腸扭結、腸套疊、膽石腸塞及腫瘤
2. 病史需包含:是否曾有腹部手術，或膽結石、疝氣。
3. 若年紀大、體重減輕、體重減輕、大便習慣改變，需考慮為腫瘤

三、腸阻塞症狀：

為腹痛、嘔吐、腹脹



四、腸阻塞診斷：


1. 麻痺性:腹脹、腸音減弱或無
2. :機械性:腹脹、腸音增高後期減弱
3. X-光檢查有異常
4. 懷疑大腸直腸阻塞，需考慮鋇劑灌腸檢查

五、手術的方式：

手術方式須剖腹探查，視阻塞原因分離腸黏連，必要時得修補、改道甚至切除部份小腸或大腸再予以吻合，更嚴重時需做腸道造口。

手術效益：（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

手術風險：（沒有任何手術（或醫療處置）是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。）



S08

南門綜合醫院 腸阻塞手術說明書(續)

手術風險：(沒有任何手術(或醫療處置)是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。)

腸阻塞手術的併發症：

1. 傷口感染、發炎，嚴重可導致敗血症及死亡。
2. 傷口愈合不良、傷口爆裂或腸再阻塞，可能需要再次手術等。術後腹中膿瘍、腹膜炎等感染症，嚴重可導致死亡。
3. 術後腸阻塞、腸蠕動麻痺。
4. 若手術需要作胃腸道的修補、切除或吻合，可能在術後發生修補吻合處溢漏，可導致腹膜炎、腹中膿瘍甚至死亡。也有可能需要再次手術。
5. 病患本身的宿疾(如糖尿病、心臟病、冠狀動脈阻塞、高血壓、肝硬化、腎功能不良、尿毒症或癌症等)，年齡因素(高齡)，營養狀況不良，曾接受放射治療、洗腎治療或曾服用藥物(如類固醇、抗排斥藥、化學治療藥物、中藥等)均會增加手術的風險及死亡率。

替代方案：(這個手術(或醫療處置)的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術(或醫療處置)，可能會有危險，請與醫師討論您的決定)

若病患不接受手術，只用保守支持性治療及觀察，可能病情變化有：

1. 病症未改善，腸道漲破，造成腹膜炎、敗血症及死亡。
2. 若病情惡化需緊急手術，因時間拖延，增加手術併發症機會及死亡率。術後應配合呼吸訓練、拍痰及下床活動，以避免術後併發症發生。

醫師補充說明：

本人(或家屬)已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且同意手術(或醫療處置)保有此資料副本一份。

*如果病患對上述說明仍有疑問，務請在簽名之前詢問醫師，或聽取其他醫師的意見作為參考。

中 華 民 國 年 月 日