



南門綜合醫院 包皮環切手術（割包皮）說明書

請您詳細閱讀

這是一份有關您接受此項手術的效益、風險及替代方案的書面說明，我們希望您能充份瞭解資料的內容，如果經醫師說明後，您對此項手術仍有疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師將會為您詳細說明。

手術目的與步驟：

- 1.包皮環切手術（割包皮）是為了解決包莖（包皮過長）、嵌性包莖（包皮過長且狹窄處嵌住陰莖影響血液回流）、慢性包皮龜頭炎等問題，而須做的手術治療以減少未來龜頭癌的機會。若僅是為了美觀考量，則術前應慎重考慮。
- 2.成人接受包皮環切手術（割包皮）時，可在局部麻醉下進行；孩童接受包皮環切手術（割包皮）時，則往往須在全身麻醉下進行。
- 3.手術時先剝開包皮露出龜頭後，在冠狀溝下方選擇適當距離切出二道皮膚深度且平行的圓周形傷口，然後把其中過長的包皮與其下的皮下組織分離並予以切除，最後進行止血工作與傷口縫合。

手術效益：（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

- 1.過長的包皮會被切除。
- 2.術後對於局部衛生的維持將有所助益。
- 3.如有包皮龜頭炎或濕疹的發生，其情況常能得以改善。

手術風險：（沒有任何手術是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。）

- 1.包皮環切手術術後可能發生出血、血腫現象（發生率約小於 30%），且多可以壓迫法控制住。
- 2.術後一週內局部應避免碰水以減少傷口感染（發生率約小於 10%）機會。
- 3.可能發生傷口疼痛及傷口腫脹現象。
- 4.可能發生傷口不易或延遲癒合。嚴重者可能需要接受清創或植皮手術（發生率約小於 1%）。
- 5.術後一段時間龜頭可能變得比較敏感。

替代方案：（這個手術的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術，可能會有危險，請與醫師討論您的決定）近年來有人嘗試以局部塗抹類固醇藥膏來治療孩童包莖而得到一定的效果，但須與醫師討論再決定。

手術後之後續治療：

- 1.術後 1 至 3 日內應回門診接受換藥治療。
- 2.術後如發生嚴重出血、血腫現象，可至門診或急診求診。

是否有其他補充說明： 是 否

如果對上述說明仍有疑問，務請在簽名之前詢問醫師，或聽取其他醫師的意見作為參考。

中 華 民 國 年 月 日