

南門綜合醫院

肺部超音波指引胸水引流管（豬尾巴）放置術說明書

請您詳細閱讀

這是一份有關您接受此項手術的效益、風險及替代方案的書面說明，我們希望您能充份瞭解資料的內容，如果經醫師說明後，您對此項手術仍有疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師將會為您詳細說明。

手術目的與步驟：

- 1.定位：通常會根據您的情況，請您採坐姿或側臥姿。之後我們會使用超音波定位，找尋適合胸水引流管放置處。
- 2.局部消毒：我們會以酒精及優碘在欲下針處做局部消毒。
- 3.局部麻醉：在已定位處，我們會以細針注射局部麻醉劑，並以細針抽吸做深度定位。注射時可能會有些疼痛，但一般稍後即可緩解。
- 4.皮膚切開：我們會在已定位處切開皮膚約半公分。雖有麻醉，但一般仍有些微感覺。
- 5.引流管放置：我們會在將引流管組裝妥當後，從已切開處送入引流管套針，待胸水流出，移除硬針，並推引流管入肋膜腔，接三向接頭後固定引流管。需引流胸水時，可將三向接頭連接軟管及引流瓶以引流胸水。
- 6.傷口包紮：再以優碘做局部消毒，並以套裝固定組包紮。
- 7.注意事項：
 - (1)在胸水引流管放置時，請您務必配合醫師指示，維持固定姿勢、或屏住呼吸，以免併發症之發生。
 - (2)放置胸水引流管之傷口應避免碰觸水份，我們會定期為傷口消毒並予以包紮。
 - (3)胸水引流管放置後，請小心勿拉扯到以避免脫落。
 - (4)您睡眠時，若以胸水引流管放置側側臥，可能會有不適。

手術效益：（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

- 1.抽出之胸水可送生化檢查、細胞學檢查及微生物培養，對於胸水之成因可提供診斷參考，以利治療之進行。
- 2.對於胸水過多而有症狀之病人，胸水引流可提供症狀緩解（如呼吸急促改善、胸痛或胸悶改善）。
- 3.可避免反覆抽胸水之不便。
- 4.提供肋膜沾黏術之給藥途徑。

肺部超音波指引胸水引流管(豬尾巴)放置術說明書(續)

手術風險：(沒有任何手術是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。)

1. 麻醉藥：極少數病人可能對局部麻醉劑有特異體質過敏。
2. 氣胸：發生率小，通常很輕微，且部份氣體亦可由胸水引流。
3. 出血：若未服用或注射抗凝劑，且無凝血功能異常者，發生率小。
4. 其它：感染(發生率小)，直接和胸水引流術相關之死亡率小。

可依病人臨床狀況，反覆實施胸水引流術。

高風險疾病評估，有以下情形請告知醫師並與醫師討論

1. 凝血功能異常者(如最近或正在使用抗凝血劑患者、嚴重腎臟衰竭或肝臟衰竭而有凝血功能障礙之患者、其他血液腫瘤相關疾病而有凝血障礙或血小板數目低下或血小板功能障礙之患者)。
2. 無法充分合作配合之病人。
3. 胸壁表皮感染之病人。
4. 心肺功能極度不良者。
5. 對麻醉藥物(如 Xylocaine) 過敏者。
6. 其他: _____

*若您在術後／返家後出現嚴重胸痛、發燒、畏寒、呼吸喘。請儘快與本院護理站(電話：03-5261122，6樓分機 621，7樓分機 721，8樓分機 821，生理功能檢查室聯絡分機 102) 或逕赴本院急診就醫治療。

* 如果病患對上述說明仍有疑問，務請在簽名之前詢問醫師，或聽取其他醫師的意見作為參考。