

南門綜合醫院 肢體截肢手術說明書

請您詳細閱讀

這是一份有關您接受此項手術的效益、風險及替代方案的書面說明，我們希望您能充份瞭解資料的內容，如果經醫師說明後，您對此項手術仍有疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師將會為您詳細說明。

手術適應症：

- 嚴重外傷因而無法重建。
- 嚴重感染，因而無法經由清創手術及抗生素治癒，進一步會引起敗血症而有生命危險。
- 周邊血管疾病，無法進行繞道手術重建，合併肢體壞疽或疼痛不止。
- 腫瘤無法有效切除及重建。
- 先天肢體異常無法有效重建而需要切除部份肢體。
- 其他

手術目的與步驟：


1. 經由手術切除感染及壞死組織或不良組織。
2. 降低局部組織細菌含量，以利人體自然修復。
3. 減少不適，加速復健治療。

手術效益：（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

1. 避免造成全身性的不良影響（如感染、敗血症、腫瘤轉移等）。
2. 促進復健治療。
3. 減少重大截肢的機率，尤其是當合併有糖尿病的下肢感染時，早期的低位截肢手術可以減低往上截肢的機率。
4. 其他。

手術風險：（沒有任何手術是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。）

1. 糖尿病壞死或血管阻塞性壞死之患者，常伴有心臟血管或腦部血管之病變，因此手術中或手術後有時無法避免心臟、肺臟或腦組織之偶發壞死而危及生命。
2. 手術後，由於患部情況不穩定，偶而再度壞死，必須再次手術修補或截肢（5-30%）。
3. 截肢部份傷口癒合延遲或感染。
4. 可能需要輸血。
5. 關節攣縮或僵硬。
6. 其他偶發之病變。
7. 腫瘤患者經截肢手術後，仍然有可能腫瘤再發或轉移。



南門綜合醫院 肢體截肢手術說明書(續)

8. 約百分之 60 的成年患者會有患肢痛(俗稱幻肢痛)，但會隨時間減輕症狀。
9. 其他不可預知之合併症。
※有其他重大內科疾病的患者，如糖尿病、肝臟(如肝硬化)、腎臟(洗腎)、心肺、內分泌及腫瘤等，均有較高的手術風險。

替代方案：(這個手術的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術，可能會有危險，請與醫師討論您的決定)

1. 嚴重肢體感染：無替代方案，或轉院接受其他醫療諮詢。
2. 嚴重肢體外傷無法重建者：無替代方案，或轉院接受其他醫療諮詢。
3. 周邊血管阻塞性疾病合併嚴重疼痛：可以嘗試藥物或血管繞道手術。
4. 良性腫瘤可以定期追蹤治療；惡性腫瘤無法切除時：無替代方案，或轉院接受其他醫療諮詢。

是否有其他補充說明： 是 否

1. 有時既存的病灶，在手術時並不一定能夠診斷出來。
2. 有時既存病灶，在手術時並不一定能夠診斷出來。
3. 患者接受清創手術期間絕對不可以抽煙、喝酒、嚼檳榔、或施打服用毒品。

*** 如果病患對上述說明仍有疑問，務請在簽名之前詢問醫師，或聽取其他醫師的意見作為參考。**

中 華 民 國 年 月 日