

南門綜合醫院 骨髓炎與軟組織感染清創手術說明書

請您詳細閱讀

這是一份有關您接受此項手術的效益、風險及替代方案的書面說明，我們希望您能充份瞭解資料的內容，如果經醫師說明後，您對此項手術仍有疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師將會為您詳細說明。

手術適應症：

- 局部細菌性感染經抗生素治療或無法以抗生素治癒者。
- 經前次手術仍然無法有效控制感染者。
- 其他_____。

手術目的與步驟：

1. 經由手術清除感染及壞死組織。
 2. 降低局部組織細菌含量，以利人體自然修復。
- ※應病情需要，有些手術需分兩階段手術或多次手術。


手術效益：（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

1. 避免造成全身性的感染。
2. 減少重大截肢的機率，尤其是當合併有糖尿病的下肢感染時，早期的外科清創手術可以減低截肢的機率。

手術風險：（沒有任何手術是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。）

1. 手術處大量流血不止，可能需要立刻加壓止血，輸血，或緊急再手術止血。
2. 有些患肢會出現神經損傷，造成感覺麻木或運動功能障礙。這些神經的傷害有些會自然恢復，但亦有些需追蹤觀察或重建手術。
3. 因感染處與血管粘連而發生血管損傷，有些必須在術後立即修補血管；但亦有些情況因感染嚴重造成重要的血管糜爛，而必須進行截肢手術。
4. 傷口再度感染，必須重複清創手術，這種情形在慢性骨髓炎及糖尿病足的病患，尤其常見，約有 8-15% 的感染再發率。
5. 骨髓炎處出現骨折不癒合或接合不正的情況，患處肢體功能會明顯降低。也會出現肌肉攣縮，關節僵硬，或肢體無力的現象。
6. 有少數慢性骨髓炎病患的患處會產生惡性癌變化，此時常需截肢處置。
7. 少數嚴重軟組織感染（壞死性筋膜炎）需進行截肢手術才能保住生命。
8. 偶而因感染組織之清創處理而導致術後敗血症現象，有時可能會危及生命。
9. 其他不可預知之突發性合併症。

※有其他重大內科疾病的患者，如糖尿病、肝臟（如肝硬化）、腎臟（如洗腎）、心肺、內分泌及腫瘤等，均有較高的手術風險。



南門綜合醫院

骨髓炎與軟組織感染清創手術說明書(續)

替代方案：(這個手術的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術，可能會有危險，請與醫師討論您的決定)

1. 局部傷口換藥或合併抗生素治療;但不一定會成功。
2. 高壓氧輔助治療，高壓氧雖然可以經由提高局部組織的含氧量，進而促進組織的癒合，但是對於已經壞死的組織仍然需要外科手術切除。
3. 轉院接受其它醫療諮詢。

是否有其他補充說明： 是 否

1. 在徹底的清創手術後，若存留有因骨髓炎而引起的後遺症如骨骼缺損、骨癒合不良或軟組織缺損，則醫師會選擇適當的後續重建手術，例如內固定或外固定鋼釘手術、補骨術、或補肉補皮術，有時需分階段實施。
2. 抽煙、喝酒、嚼檳榔等習慣會影響血液循環及抵抗力，降低組織的癒合能力，因此患者接受清創手術期間絕對不可以抽煙、喝酒、嚼檳榔、或自行濫用藥物。
3. 若有疑慮可以尋求第二位醫師意見。

*** 如果病患對上述說明仍有疑問，務請在簽名之前詢問醫師，或聽取其他醫師的意見作為參考。**

中 華 民 國 年 月 日